

塔崩 簡明資料

什麼是塔崩？

塔崩 (tabun) 是一種人造化學戰爭製劑，屬神經性製劑。塔崩最初在德國作為殺蟲劑研製。這種神經性製劑是一種透明、無色、無味的液體，有淡淡的果味。加熱後會蒸發。

如何會接觸塔崩？

如果塔崩氣體洩入空氣中，可通過吸入、皮膚或眼睛接觸接觸塔崩。塔崩洩入水中後，可通過接觸或飲用污染的水接觸塔崩。如果食品被塔崩污染，也可能接觸塔崩。衣服在接觸塔崩氣體後會在 30 分鐘左右的時間內釋放毒素，使他人接觸塔崩。

接觸後多久會出現症狀？

可能在接觸塔崩氣體後的幾秒鐘內出現症狀，但接觸塔崩液體後，症狀最遲會在 18 小時內出現。一旦接觸這種神經性製劑，就會擾亂人體腺體及肌肉的「關閉機制」，造成中毒反應。沒有「關閉機制」，腺體及肌肉就會持續受到刺激，可能導致無法呼吸。

接觸後有哪些症狀？

因為塔崩散發出淡淡的果味，因此很難被人察覺。如果經由吸入、攝入或皮膚接觸少量或中量接觸塔崩，可能在幾秒鐘或幾小時內可出現以下症狀：流鼻涕、流淚、視線模糊、流口水、大量出汗、咳嗽、胸悶、呼吸急促、腹瀉、尿頻、意識混亂、虛弱、頭痛、嘔吐、噁心、心跳緩慢或加快以及低血壓或高血壓。接觸大量塔崩可使人失去知覺、驚厥、癱瘓及呼吸困難，甚至導致死亡。

如果我發覺自己接觸了塔崩，該怎麼辦？

如果在接觸塔崩後有解毒劑並及時使用，患者可能康復。如果您認為自己已接觸塔崩，立即轉移到空氣新鮮的地方。脫掉衣服，立即用肥皂及水清洗全身。如果感到眼睛灼熱或視線模糊，用清水沖洗 10 至 15 分鐘。如果您佩戴隱形鏡片，在清洗之前取下隱形鏡片。把被污染的衣服及隱形鏡片放入塑膠袋封好，再把封好的塑膠袋放入另一隻塑膠袋封好。如果攝入塔崩，不得飲用液體或誘吐。立刻撥 911 電話，請求醫療協助，並清除被污染的物品。不要獨自駕車前往醫院，因為您有可能在去醫院的途中病情惡化。

我可以從何處獲得有關塔崩的更多資訊？

www.bt.cdc.gov
www.dshs.state.tx.us
www.state.nj.us/health/eoh/rtkweb/rtkhsfs.htm

資訊來源:

疾病控制與預防中心 (CDC)