

碘化鉀 簡明資料

什麼是碘化鉀？

碘化鉀(potassium iodide/簡稱 KI) 是一種含碘的鹽片，可幫助預防人類甲狀腺吸收放射性碘。

什麼時候服用碘化鉀？

您所在地的緊急事件管理官員會通知您服用時間。

我及我的孩子應服用多少劑量？

碘化鉀被製成 130 毫克劑量的藥片。通常，本簡明資料中建議的一次性服用劑量就足夠。3 - 18 歲的兒童服用 130 毫克劑量的一半 (65 毫克) ，一個月至三歲的幼兒服用 130 毫克藥片的 1/4 ，新生兒至一個月的嬰兒服用 130 毫克藥片的 1/8 ；應將藥片碾碎，調入水、嬰兒配方奶或母乳中，放入瓶內讓嬰兒飲用。如果您正在哺乳，則應服用成人劑量；您的孩子應服用建議的嬰兒劑量。接近成年體重的青少年 (體重超過 150 磅) 應服用成人劑量。

哪些人不能服用碘化鉀？

如果您被診斷患有甲狀腺疾病、對鉀過敏 (如果您對甲殼類動物過敏，請向您的醫生或藥劑師諮詢是否能服用碘化鉀) 及/或患有某些皮膚疾病，則不能服用碘化鉀。

為什麼碘對於甲狀腺很重要？

甲狀腺從血液中吸收碘，用於分泌甲狀腺激素。沒有適量的碘，甲狀腺就無法分泌此類激素。

我可以從何處獲得有關碘化鉀的更多資訊？

www.bt.cdc.gov/radiation/index.asp

www.epa.gov/

www.dshs.state.tx.us

美國國家應答團隊網站：<http://www.nrt.org>

資訊來源:

www.hcphe.org
Harris County Public Health & Environmental Services
2223 West Loop South
Houston, TX 77027

2006 年 1 月 9 日

疾病控制與預防中心 (CDC)

如果您發現自己接觸了碘化鉀，立刻撥 911 電話，請求醫療協助。不要獨自駕車前往醫院，因為您有可能在去醫院的途中病情惡化。

www.hcphe.org

Harris County Public Health & Environmental Services
2223 West Loop South
Houston, TX 77027

2006 年 1 月 9 日