

暴亂控制劑

簡明資料

什麼是暴亂控制劑？

暴亂控制劑（亦稱為催淚彈）用化合物製成，透過刺激眼睛、口腔、喉嚨、肺部及皮膚的方法限制個人的活動能力。執法人員利用催淚彈控制人群，軍隊把催淚彈當作訓練手段，測試在固定時間內穿戴防毒面具的速度與能力。

如何會接觸暴亂控制劑？

如果暴亂控制劑洩漏入空氣中，則可能經由呼吸、皮膚或眼睛接觸而接觸。離開污染源及排除污染（清洗）後，接觸暴亂控制劑的影響一般很短（15至30分鐘）。

接觸後多久會出現症狀？

症狀取決於暴亂控制劑的接觸途徑、數量及時間長短。

接觸後有哪些症狀？

眼睛會紅腫、多淚、視線模糊。如果呼吸入暴亂控制劑，可能出現流鼻涕、紅腫、胸悶、咳嗽或呼吸急促等症狀。如果攝入暴亂控制劑，則可能出現吞嚥困難、噁心及嘔吐等症狀。如果長時間接觸，其嚴重影響可能導致失明或呼吸困難，甚至死亡。

如果我發覺自己接觸了暴亂控制劑，該怎麼辦？

如果暴亂控制劑洩漏發生在室外，離開洩漏地，移至有新鮮空氣的場所。盡可能前往最高處，因為暴亂控制劑會形成濃厚的蒸汽雲，浮游於地表。如果洩漏發生在室內，離開建築物。如果您靠近暴亂控制劑洩漏地，可能會要求您離開現場或在建築物內「躲避」，以免接觸該化學品。

如果您認為自己已接觸暴亂控制劑，應當立即脫掉衣服，並用肥皂及水清洗全身。如果感到眼睛灼熱或視線模糊，用清水沖洗10至15分鐘。如果您佩戴隱形鏡片，在清洗之前取下隱形鏡片。把被污染的衣服及隱形鏡片放入塑膠袋封好，再把封好的塑膠袋放入另一隻塑膠袋封好。**立刻撥911電話，請求醫療協助，並清除被污染的物品。不要獨自駕車前往醫院，因為您有可能在去醫院的途中病情惡化。**

我可以從何處獲得有關暴亂控制劑的更多資訊？

www.bt.cdc.gov
www.dshs.state.tx.us

www.state.nj.us/health/eoh/rtkweb/rtkhsfs.htm

資訊來源:

疾病控制與預防中心 (CDC)